

**En cas de cicatrices
lors d'accident
ou d'opération**

Zusammensetzung/Composition:
Allii cepae extractum 100 mg, hyoscyami maceratum oleosum 50 mg, allantoinum 20 mg, heparinum natricum 200 U.I., avobenzone (UV-A-Filter) 12 mg, 3-(4-methylbenzylidène) bornan-2-one (UV-B-Filter) 8 mg, aromatica, propylenglycol, antiox.: E 321, conserv.: chlorhexidini gluconas, excip. ad unguentum pro 1 g.

Keli-med®

crème



Anti-chéloïde spécifique

Keli-med
20 g crème

LOT: 00410020
EXP: 07.2014

En cas de cicatrices lors d'accident ou d'opération

Éviter tout contact avec les plaies ouvertes, les muqueuses et les yeux. Voir notice d'emballage. Ne pas avaler. Conserver à température ambiante (15–25°C) et hors de la portée des enfants.

Information destinée aux patients

Keli-med® crème

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Keli-med et quand est-il utilisé?

Keli-med est une crème destinée au traitement du tissu cicatriciel, c'est-à-dire une crème dont les composants favorisent une bonne guérison des cicatrices.

Keli-med prévient la formation excessive de kératine (couche cornée) et de boursouffures indurées au niveau de la cicatrice et favorise la régénération tissulaire. Keli-med contient un filtre UV-A (avobenzone) et un filtre UV-B (méthyl-4 benzylidène-3 bornane-2-one) pour protéger les cicatrices de l'action des rayons ultraviolets.

Keli-med est utilisé en cas de cicatrices inconfortables de toute origine, par exemple après intervention chirurgicale, greffe de peau, blessures par piqûre ou coupure, brûlures, cautérisation, irradiation, etc.

Quand Keli-med ne doit-il pas être utilisé?

Keli-med ne doit pas être appliqué sur des plaies ouvertes ou sur les cicatrices de la muqueuse. Keli-med est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 mois. Il ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité avérée à l'un de ses composants.

Keli-med ne doit pas être utilisé en cas de thrombopénie induite par l'héparine (TIH, chute du nombre de plaquettes sanguines induite par l'héparine).

Quelles sont les mesures de précaution à observer lors de l'utilisation de Keli-med?

Appliquer uniquement sur la peau intacte, jamais sur des plaies ouvertes. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

Keli-med ne doit pas être appliqué dans les 15 jours qui suivent une opération. Il faut attendre que la plaie se soit bien refermée.

Veillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà d'autres médicaments à usage interne ou externe (même en automédication!).

Keli-med peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Keli-med n'a jamais fait l'objet d'études scientifiques systématiques. Cependant, les expériences faites à ce jour montrent qu'il ne présente aucun risque pour le fœtus s'il est utilisé comme il se doit.

Keli-med ne doit pas être utilisé sans autorisation médicale pendant la grossesse et la période d'allaitement.

Comment utiliser Keli-med?

Adultes et enfants à partir de 2 ans:

Appliquer Keli-med plusieurs fois par jour en frictionnant doucement; lors de cicatrices plus grossières, masser légèrement jusqu'à ce que la crème ait bien pénétré dans la peau. En présence de brides cicatricielles boursouffées, il est recommandé d'appliquer la crème en couche épaisse et de recouvrir d'un pansement pour la nuit. Suivant l'importance des défauts cicatriciels, le traitement s'étend sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le succès thérapeutique dépend d'une utilisation régulière et systématique du médicament.

L'application sur de grandes surfaces chez l'enfant de moins de 12 ans, de même que toute utilisation chez l'enfant de moins de 2 ans ne devrait se faire que sur prescription médicale.

Veillez vous conformer au dosage indiqué dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Quels effets indésirables Keli-med peut-il avoir?

Les effets indésirables suivants peuvent se produire: rarement, des réactions allergiques locales. Le cas échéant, il y a lieu d'interrompre le traitement.

Si vous constatez d'autres effets indésirables, vous devriez en informer votre médecin, pharmacien ou droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15 – 25°C).

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant sur le récipient après la mention «EXP».

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre médecin, pharmacien ou droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Keli-med?

1 g de Keli-med contient comme substances actives: 100 mg d'extrait d'oignon, 50 mg d'huile de jusquiame, 20 mg d'allantoïne, 200 U.I. d'héparine sodique, 12 mg d'avobenzone (filtre UV-A) et 8 mg de méthyl-4 benzylidène-3 bornane-2-one (filtre UV-B). Excipients: aromatisants, propylène glycol, E 321 (antioxydant), gluconate de chlorhexidine (conservateur) et d'autres substances auxiliaires.

Numéro d'autorisation: 47 456 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Keli-med?

Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 20 et 50 g.

Titulaire de l'autorisation: Permamed SA, CH-4143 Dornach

Cette notice d'emballage a été approuvée par les autorités de contrôle des médicaments (Swissmedic) en décembre 2006.